

Гострий гнійний середній отит. Мастоїдит.

Лекція для лікарів-інтернів за спеціальністю
«Отоларингологія»
кафедри оториноларингології з
офтальмологією ПДМУ

ЗОВНІШНІЙ ОТИТ



Οτομικροζ



Гострий гнійний середній отит

Етіологія – патогенна вірусна (*віруси грипу, парагрипу, аденовірусні інфекції*) та бактеріальна мікрофлора (*частіше – кокова мікрофлора*).

Патогенез – зниження опірності організму.

Шляхи проникнення інфекції у середнє вухо:

- рино-тубарний шлях;
- через зовнішній слуховий прохід (*травма барабанної перетинки*);
- гематогенний шлях.

стан носа та носоглотки (*аденоїди, аденоїдит, гіпертрофічний риніт, викривлення перегородки носа, гнійні синуїти, хірургічні втручання в порожнині носа та носоглотки, передня або задня тампонада носа*)

структура сосковидного відростка (*пневматичний, діплетичний, склеротичний*)

Гострий гнійний середній отит




Гострий гнійний середній отит




Клінічна картина

- 1** стадія – неперфоративна
- 2** стадія – перфоративна
- 3** стадія – репаративна або зворотнього розвитку




мастоїдит



Первинний

*Травма сосковидного
відростка,
гематогенний заніс,
сифіліс, туберкульоз*



Вторинний

*Ускладнення гнійного
середнього отиту,
загострення гнійного
середнього отиту*





Атипові форми мастоїдиту:

- Зигоматицит
- Верхівково-шийний *(Бецольдівський)*
- Чітеллі
- Скваміт
- Петрозит
- Антрит *(отоантрит)*

CT/ro Skull SYNOCT
Sn: 215.00
Sn: 2
OH 210.00
Sn: 5
NEW 25.0cm
SID=71
A 214
Faltara anghospital
VARTANOV S.A.
H 47 7
SMD: 22 Aug 1960
19 Apr 2007
510



kv 120
ma 160
Head
4.00mm/11
Tilt: 0.0
0.0m 00:33:50
0:0170 1:016

CT/ro Skull SYNOCT
Sn: 215.00
Sn: 2
OH 210.00
Sn: 5
NEW 25.0cm
SID=71
A 214
Faltara anghospital
VARTANOV S.A.
H 47 7
SMD: 22 Aug 1960
19 Apr 2007
510



kv 120
ma 160
Head
4.00mm/11
Tilt: 0.0

CT/ro Skull SYNOCT
Sn: 215.00
Sn: 2
OH 210.00
Sn: 5
NEW 25.0cm
SID=71
A 214
Faltara anghospital
VARTANOV S.A.
H 47 7
SMD: 22 Aug 1960
19 Apr 2007
510



kv 120
ma 160
Head
4.00mm/11
Tilt: 0.0
0.0m 00:33:50
0:0170 1:016

CT/ro Skull SYNOCT
Sn: 215.00
Sn: 2
OH 210.00
Sn: 5
NEW 25.0cm
SID=71
A 214
Faltara anghospital
VARTANOV S.A.
H 47 7
SMD: 22 Aug 1960
19 Apr 2007
510



kv 120
ma 160
Head
4.00mm/11
Tilt: 0.0


Диференційно-діагностичні ознаки клінічних форм хронічного гнійного середнього отиту

Діагностичні ознаки	Хронічний гнійний мезотимпаніт	Хронічний гнійний епітимпаніт
Локалізація процесу в барабанній порожнині	Середній і нижній відділи	Всі відділи з переважною локалізацією у верхньому (атику)
Глибина поширення процесу	Слизова оболонка	Слизова оболонка і кісткові структури
Скарги хворого	Гноєтеча з вуха, зниження слуху, може бути відчуття шуму у вусі	Гноєтеча з вуха, зниження слуху, може бути відчуття шуму у вусі. Нерідко - головний біль, запаморочення
Характер виділень	Слизове або слизово-гнійне, без запаху	Гнійне, із запахом
Тип перфорації	Колова (центральна)	Крайова
Патологічний вміст у барабанній порожнині	Гній, грануляції, поліпи	Гній, грануляції, поліпи, холестеатома
Характер глухуватості	Басова	Змішана з переваженням басової
Рентгенографія скроневи́х кісток	Склерозування	Склерозування, ділянок розрідження і деструкції в атикоантральній ділянці

Мезотимпаніт



Епітимпаніт



Епітимпаніт



