

Тест 2

- Жінка 29-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на остуду, біль у горлі, утруднене ковтання та підвищення температури тіла до 38°C. При фізикальному обстеженні лікарем на обох мигдаликах виявлено нальоти у вигляді сірих щільних плівок, збільшення і болючість підщелепних лімфатичних вузлів. Використання якого діагностичного методу буде найбільш доречним наступним кроком?
- (Тема 7. Гострі захворювання глотки. Первинні і вторинні ангіни. Ускладнення ангін, заглотковий абсцес, дифтерія глотки.)

Тест 2

Жінка 29-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на остуду, біль у горлі, утруднене ковтання та підвищення температури тіла до 38°C. При фізикальному обстеженні лікарем на обох мигдаликах виявлено **нальоти у вигляді сірих щільних плівок**, збільшення і болючість підщелепних лімфатичних вузлів. Використання якого діагностичного методу буде **найбільш доречним** наступним кроком?

- А. Пункція підщелепних лімфовузлів
- В. Аналіз на гетерофільні антитіла
- С. Рентгенографія м'яких тканин шиї
- D. Експрес тест для виявлення антигенів стрептококу групи А

Тест 2

- Жінка 29-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на остуду, біль у горлі, утруднене ковтання та підвищення температури тіла до 38°C. При фізикальному обстеженні лікарем на обох мигдаликах виявлено **нальоти у вигляді сірих щільних плівок**, збільшення і болючість підщелепних лімфатичних вузлів. Використання якого діагностичного методу буде **найбільш доречним** наступним кроком?
- А. Бактеріологічне дослідження мазку із порожнини носа та горла**