

35-річний чоловік звернувся до лікаря зі скаргами на сильний біль у правому оці, світлобоязнь, слізотечу, погіршення зору. Скарги з'явились після роботи зі зварювальним апаратом. Контактні лінзи не використовує. Під час огляду: очна щілина звужена, помірна перикорнеальна ін'єкція, гострота зору збережена. Після інстиляції розчину анестетика, стан полегшився, що дало можливість провести огляд у щілинній лампі та виявити дефект рогівки розміром 3 мм, що зафарбувався флюоресцеїном. Яке лікування буде найбільш доречним?

(ТЕМА 8. Захворювання рогівки, склери)

ТЕМА 8. Захворювання рогівки, склери

35-річний чоловік звернувся до лікаря зі скаргами на сильний біль у правому оці, світлобоязнь, слізотечу, погіршення зору. Скарги з'явились після роботи зі зварювальним апаратом*. Контактні лінзи не використовує. Під час огляду: очна щілина звужена, помірна перикорнеальна ін'єкція, гострота зору збережена. Після інстиляції розчину анестетика, стан полегшився, що дало можливість провести огляд у щілинній лампі та виявити дефект рогівки розміром 3 мм, що зафарбувався флюоресцеїном*. Яке лікування буде найбільш доречним?

Інстиляція сульфацилу натрію

Інстиляція дексаметазону

Сухе тепло

Інстиляція таурину

Інстиляція офлоксацину

Ключові слова*

ТЕМА 8. Захворювання рогівки, склери

35-річний чоловік звернувся до лікаря зі скаргами на сильний біль у правому оці, світлобоязнь, слізотечу, погіршення зору. Скарги з'явились після роботи зі зварювальним апаратом. Контактні лінзи не використовує. Під час огляду: очна щілина звужена, помірна перикорнеальна ін'єкція, гострота зору збережена. Після інстиляції розчину анестетика, стан полегшився, що дало можливість провести огляд у щілинній лампі та виявити дефект рогівки розміром 3 мм, що зафарбувався флюоресцеїном. Яке лікування буде найбільш дoreчним?

Інстиляція сульфацилу натрію

Інстиляція дексаметазону

Сухе тепло

Інстиляція таурину

Інстиляція офлоксацину