

Тест 15 (06.03.2025)

У хлопчика 2 років на тлі лакунарної ангіни погіршилось дихання носом і ротом. Під час мезофарингоскопії спостерігаються гіперемія піднебінних мигдаликів і задньої стінки глотки, жовтуваті плівки в устях лакун мигдаликів, а також випинання задньої стінки ротоглотки, що флюктує під час пальпації. Якого ускладнення слід запобігати під час хірургічного втручання?

- (Тема 7. Гострі захворювання глотки. Первинні і вторинні ангіни. Ускладнення ангін, заглотковий абсцес, дифтерія глотки).

Тест 15

У хлопчика 2 років на тлі лакунарної ангіни погіршилось дихання носом і ротом. Під час мезофарингоскопії спостерігаються гіперемія піднебінних мигдаликів і задньої стінки глотки, жовтуваті плівки в устях лакун мигдаликів, а також випинання задньої стінки ротоглотки, що флюктує під час пальпації. Якого ускладнення слід запобігати під час хірургічного втручання?

- А. Медіастиніт
- В. Травма магістральних судин
- С. Ретроезофагіт
- D. Порушення лімфовідтоку

Тест 15

У хлопчика 2 років на тлі лакунарної ангіни погіршилось дихання носом і ротом. Під час мезофарингоскопії спостерігаються гіперемія піднебінних мигдаликів і задньої стінки глотки, жовтуваті плівки в устях лакун мигдаликів, а також випинання задньої стінки ротоглотки, що флюктує під час пальпації. Якого ускладнення слід запобігати під час хірургічного втручання?

➡ А. Асфіксія гноєм