

Тест 3

- Чоловік 56-ти років звернувся до лікаря з носовою кровотечею, що розпочалася з лівої ніздрі 30 хвилин тому. Будь-які травми носа пацієнт заперечує. В анамнезі: частих носових кровотеч немає, подібний епізод вперше. Хворіє на фібриляцію передсердь (приймає варфарин) та артеріальну гіпертензію (лікується гідрохлортіазидом, атенололом). Температура тіла – 37,2 °С, пульс – 86/хв., артеріальний тиск – 120/70 мм.рт.ст. Перед тим, як визначити необхідність тампонади носа, який першочерговий крок лікаря буде найбільш доречним?
- (Тема 15. Травми носа, носові кровотечі. Сторонні тіла ЛОР-органів.)

Тест 3

Чоловік 56-ти років звернувся до лікаря з **носовою кровотечею**, що розпочалася з лівої ніздрі 30 хвилин тому. Будь-які травми носа пацієнт заперечує. В анамнезі: частих носових кровотеч немає, подібний епізод вперше. Хворіє на фібриляцію передсердь (**приймає варфарин**) та **артеріальну гіпертензію** (лікується гідрохлортіазидом, атенололом). Температура тіла – 37,2 °С, пульс – 86/хв., артеріальний тиск – 120/70 мм.рт.ст. Перед тим, як визначити необхідність тампонади носа, який **першочерговий крок** лікаря буде найбільш доречним?

- Ввести вітамін К внутрішньом'язово
- Призначити каптоприл перорально
- Прикласти холодний компрес на перенісся
- -

Тест 3

Чоловік 56-ти років звернувся до лікаря з **носовою кровотечею**, що розпочалася з лівої ніздрі 30 хвилин тому. Будь-які травми носа пацієнт заперечує. В анамнезі: частих носових кровотеч немає, подібний епізод вперше. Хворіє на фібриляцію передсердь (**приймає варфарин**) та **артеріальну гіпертензію** (лікується гідрохлортіазидом, атенололом). Температура тіла – 37,2 °С, пульс – 86/хв., артеріальний тиск – 120/70 мм.рт.ст. Перед тим, як визначити необхідність тампонади носа, який **першочерговий крок** лікаря буде найбільш доречним?

- ➡ **А. Оксиметазоліну інтраназально, попросити хворого затиснути крило носа та нахилитися вперед**