




У пацієнта віком 58 років протягом 2-3 годин з'явилися множинні плями перед правим оком. Під час обстеження спостерігається: гострота зору становить 0,02 ексцентрично, зіниця правого ока помірно розширена, пряма реакція на світло знижена. За результатами офтальмоскопії виявлено: на очному дні множинні крововиливи різної величини та форми (симптом «розчавленого помідора»), диск зорового нерва набряклий; гіперемований. Із анамнезу відомо про наявність гіпертонічної хвороби II ступеня. Який найімовірніший діагноз?

(ТЕМА 11.Захворювання сітківки. Невідкладні стани в офтальмології (гостра непрохідність центральної вени сітківки та її гілок, емболія центральної артерії сітківки, відшарування сітківки, флегмона орбіти).)

У пацієнта віком 58 років протягом 2-3 годин з'явилися множинні плями перед правим оком.* Під час обстеження спостерігається: гострота зору становить 0,02 ексцентрично, зіниця правого ока помірно розширена, пряма реакція на світло знижена. За результатами офтальмоскопії виявлено: на очному дні множинні крововиливи різної величини та форми (симптом «розчавленого помідора»),* диск зорового нерва набряклий; гіперемований. Із анамнезу відомо про наявність гіпертонічної хвороби II ступеня*. Який найімовірніший діагноз?

Тромбоз центральної вени сітківки

Діабетична ретинопатія

Гіпертонічна ангіонейропатія

Гіпертонічна ангіопатія

Емболія центральної артерії сітківки

(ТЕМА 11.Захворювання сітківки. Невідкладні стани в офтальмології (гостра непрохідність центральної вени сітківки та її гілок, емболія центральної артерії сітківки, відшарування сітківки, флегмона орбіти).)

Ключові слова*

У пацієнта віком 58 років протягом 2-3 годин з'явилися множинні плями перед правим оком. Під час обстеження спостерігається: гострота зору становить 0,02 ексцентрично, зіниця правого ока помірно розширена, пряма реакція на світло знижена. За результатами офтальмоскопії виявлено: на очному дні множинні крововиливи різної величини та форми (симптом «розчавленого помідора»), диск зорового нерва набряклий; гіперемований. Із анамнезу відомо про наявність гіпертонічної хвороби II ступеня. Який найімовірніший діагноз?

Тромбоз центральної вени сітківки

Діабетична ретинопатія

Гіпертонічна ангіонейропатія

Гіпертонічна ангіопатія

Емболія центральної артерії сітківки

(ТЕМА 11.Захворювання сітківки. Невідкладні стани в офтальмології (гостра непрохідність центральної вени сітківки та її гілок, емболія центральної артерії сітківки, відшарування сітківки, флегмона орбіти).)