

Українська медична стоматологічна академія
кафедра оториноларингології

Отеки и стенозы гортани.
Острые и хронические
ларингиты.

Зав. Професор Безшапочний С.Б.

ОТЕК ГОРТАНИ



```
graph TD; A[ОТЕК ГОРТАНИ] --> B[ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ]; A --> C[НЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ];
```


ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ

Гортанная ангина
Флегмонозный ларингит
Абсцесс надгортанника
Нагноительные процессы в глотке
Травмы после операции
После длительной интубации
После лучевой терапии

НЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ

Аллергия, в т.ч.
ангионевротический отек Квинке
Заболевания ССС с
недостаточностью кровообр. II - III
степени
Заболевания почек
Цирроз печени
Кахексии

ОТЕК ГОРТАНИ



СТЕНОЗ ГОРТАНИ

(ПО ВРЕМЕНИ РАЗВИТИЯ)

- Молниеносный – секунды, минуты
(аспирация инородного тела)
- Острый стеноз – часы, до суток *(гортанная ангина, ожог, отек)*
- Подострый стеноз – больше суток, до недели
(дифтерия гортани, травмы и др.)
- Хронический стеноз – неделя и более
(опухоли гортани, инфекционные гранулемы)

СТАДИИ СТЕНОЗА ГОРТАНИ

- 1. Компенсации
- 2. Субкомпенсации
- 3. Декомпенсации
- 4. Терминальная

I стадия компенсации

- углубление и урежение дыхания
- уменьшение пауз между вдохом и ВЫДОХОМ
- умеренная брадикардия
- инспираторная одышка при физической нагрузке

II Стадия субкомпенсации

- инспираторная одышка в покое
- шумное дыхание
- кожа бледная
- общее беспокойство
- участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания

III Стадия декомпенсации

- дыхание частое, поверхностное
- кожа бледно-синюшная
- вынужденное положение с запрокинутой головой
- большая экскурсия гортани
- потливость
- частый слабый пульс

IV Стадия - терминальная

- безразличие
- дыхание поверхностное, прерывистое типа Чейна-Стокса
- кожа бледно-серого цвета
- пульс частый, нитевидный
- зрачки расширены
- потеря сознания
- непроизвольное мочеиспускание, дефекация
- смерть

Стеноз гортані



Трахеотомія



Трахеостомія



Острый ларингит

Причины:

- респираторная вирусная инфекция
- бактериальная флора: под влиянием экзо- и эндогенных факторов становится патогенной.

Экзогенные:

- термические
- злоупотребление спиртными напитками
- курение
- перенапряжение голоса
- профвредности (пыль)

Эндогенные

- обменные нарушения, при которых повышается чувствительность к раздражителям

ХРОНИЧЕСКИЙ ЛАРИНГИТ

Способствующие факторы:

- Повторяющиеся острые ларингиты
- Длительное перенапряжение голоса
- Курение, злоупотребление алкоголем
- Профессиональные вредности
- Хронические риниты, синуситы, искривления носовой перегородки
- Хронический тонзиллит, фарингит
- Заболевания сердца и легких – застойные явления верхних дыхательных путей
- Аллергическая предрасположенность
- Заболевания желудочно-кишечного тракта
- Эндокринные расстройства

ФОРМЫ ХРОНИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА

катаральный

Гиперемия и
утолщение голосовых
складок
Неполное смыкание
голосовых складок
Вязкая слизь

гипертрофический

Гипертрофия эпителия и
подслизистого слоя


Диффузный

атрофический

Атрофия эпителия и
подслизистого слоя

Ограниченный





ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!