

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ З ОФТАЛЬМОЛОГІЄЮ

Тема: Новоутворення судинної оболонки ока



Лектор: д. мед. наук, професор Безкоровайна І.М.




План лекції:

1. Пухлини райдужки
2. Пухлини циліарного тіла
3. Пухлини хоріоїдеї
4. Клінічний випадок
5. Питання по темі лекції

Судинна оболонка ока

складається з 3 частин:

- райдужка;
- війчасте тіло;
- власне судинна оболонка



Доброякісні пухлини

Лейоміома - розвивається з елементів зіничних м'язів, росте повільно.



пігментна (розвиваються з елементів дилататора)





- світло-коричневого або темно-коричневого кольору;
- вузлова, плоска, змішана форми росту;
- локалізується в циліарному поясі райдужки;
- зміна форми зіниці (подовження);
- щільна консистенція, поверхня бугриста;



безпігментна (розвиваються зі сфінктера)





- жовто-рожевого кольору;
- у вигляді напівпрозорого промінючого вузла;
- локалізація: по зіничному краю, в зоні круга Краузе, в перикорнеальній зоні;
- межі чіткі, консистенція рихла, студениста;
- на поверхні знаходяться напівпрозору вирости, в центрі яких - судинні петлі (можуть бути джерелом рецидивуючих крововиливів в передню камеру)



Рацемозна гемангіома




Діагностують на основі даних:

- біомікроскопії
- гоніоскопії
- діафаноскопії
- флюоресцентної іридоангіографії





Схеми склероувектомії та брахітерапії



Контрольні запитання по темі лекції:

1. Яка анатомічна будова судинної оболонки?
2. Види лейоміоми райдужки.
3. Чи можуть капілярні гемангіоми самі регресувати?
4. Які ознаки прогресування пухлини?
5. Клінічні форми гемангіом.
6. Основні клінічні ознаки меланому.
7. Методи лікування меланому.